

ข้อบ่งใช้ : ในผู้ใหญ่เพื่อบรรเทาหรือป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีสาเหตุจากความผิดปกติของทางเดินอาหาร และการได้รับเคมีบำบัด หรือรังสีรักษา อาการแสบร้อนกลางอก ปวดท้อง ท้องอืด แน่นท้องหลังรับประทานอาหาร ยานี้อาจใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่นๆได้ (ดูขนาดยา) หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร

: ในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า ๒๐ ปี ควรจำกัดไว้ใช้เฉพาะกับผู้ป่วยที่มีอาการอาเจียนอย่างรุนแรง และต้องการรักษา ซึ่งเป็นการอาเจียนที่รู้สาเหตุของการอาเจียน รวมทั้งการอาเจียนจากการได้รับเคมีบำบัดหรือรังสีรักษา และใช้ช่วยในการสอดท่อเข้าทางเดินอาหารเพื่อการวินิจฉัยโรค

วิธีการให้ยา

วิธีให้ยาต่อไปนี้เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ใช่สำหรับผู้ให้ยาเฉพาะราย โปรดปฏิบัติตามวิธีใช้ที่ระบุบนฉลากยา

-รับประทานยาตอนท้องว่าง โดยรับประทานก่อนอาหาร ๓๐ นาที ตามขนาดและความถี่ที่ระบุไว้บนฉลาก

-ไม่ควรให้ยาในขนาดที่มากหรือน้อยกว่าที่ระบุ และหากมีข้อสงสัยให้สอบถามแพทย์หรือเภสัชกร

ขนาดยาและวิธีการให้ยา

-สำหรับการคลื่นไส้และอาเจียน โดยเฉพาะที่เกิดจากความผิดปกติของทางเดินอาหาร ให้ยาทางปาก ทางหลอดเลือดดำหรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ผู้ใหญ่ ๑๐ มิลลิกรัม วันละ ๓ ครั้ง, อายุ ๑๕-๑๙ ปีที่มีน้ำหนักต่ำกว่า ๖๐ กิโลกรัม คือ ๕ มิลลิกรัม วันละ ๓ ครั้ง เด็ก คือ ๐.๑-๐.๒ มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก ๖-๘ ชั่วโมง

-สำหรับการคลื่นไส้และอาเจียนจากการตั้งครภ์ ให้ยาทางปาก ทางหลอดเลือดดำ หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ผู้ใหญ่ ๕-๑๐ มิลลิกรัม ทุก ๘ ชั่วโมง

-สำหรับป้องกันการคลื่นไส้และอาเจียนหลังการผ่าตัด โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ผู้ใหญ่ ๑๐ มิลลิกรัม ให้ซ้ำได้ทุก ๔-๖ ชั่วโมง และเด็ก ๐.๑-๐.๒ มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก ๖-๘ ชั่วโมง

-สำหรับป้องกันการคลื่นไส้และอาเจียนที่เกิดจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือการให้รังสีรักษา โดยการให้ยาหยดเข้าทางหลอดเลือดดำ ผู้ใหญ่ ๑-๒ มิลลิกรัม/กิโลกรัม ก่อนการให้ยาหรือรังสีรักษา ๓๐ นาที ให้ซ้ำได้ทุก ๒ ชั่วโมง เด็ก ๑-๒ มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก ๒-๔ ชั่วโมง

-สำหรับการรักษาโรคกรดไหลย้อนและรอยโรคที่เกี่ยวข้องซึ่งมีสาเหตุจากหลอดอาหารอักเสบเป็นแผล ให้ยาทางปากก่อนอาหาร ๓๐ นาที ผู้ใหญ่ ๑๐-๑๕ มิลลิกรัม ให้ได้ถึงวันละ ๔ ครั้ง ผู้สูงอายุ ๕ มิลลิกรัม เด็ก เด็กทารก และเด็กแรกเกิด ๐.๔-๐.๘ มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้วันละ ๔ ครั้ง

-สำหรับช่วยในการสอดท่อเข้าทางเดินอาหารและใช้ในการช่วยวินิจฉัย ขณะทำรังสีวินิจฉัยของทางเดินอาหาร โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ ผู้ใหญ่ ๑๐ มิลลิกรัม เด็กอายุ ๖-๑๔ ปี ๒.๕-๕ มิลลิกรัม

สำหรับอัมพาตกระเพาะอาหาร (gastroparesis) ในผู้ป่วยเบาหวาน ให้ยาทางปาก ทางหลอดเลือดดำ หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ผู้ใหญ่ ๑๐ มิลลิกรัม วันละ ๔ ครั้ง ก่อนอาหาร ๓๐ นาที นาน ๒-๘ สัปดาห์

-สำหรับอาการสะอึกที่เป็นอย่างต่อเนื่อง หมายเหตุ เป็นข้อบ่งใช้ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก US FDA โดยให้ยาทางปาก ทางหลอดเลือดดำ หรือฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ผู้ใหญ่ ๑๐ มิลลิกรัม ทุก ๖ ชั่วโมง

-สำหรับการกระตุ้นการหลั่งน้ำนมในมารดาหลังคลอด หมายเหตุ เป็นข้อบ่งใช้ที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก US FDA ให้ยาทางปาก ผู้ใหญ่ ขนาดยาเริ่มต้น ๑๐ มิลลิกรัม วันละ ๒-๓ ครั้ง

อาการไม่พึงประสงค์

ท้องผูก ท้องเสีย เหนื่อยล้า ภาวะกระหาย เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ส่วนอาการไม่พึงประสงค์ที่ต้องแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรทันที มีดังนี้ ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของแขน ขา ศีรษะหรือตา มีการหดเกร็งหรือกระดูกของกล้ามเนื้อคอ ไบพาร์ และขากรรไกร มีอาการเคลื่อนไหวลำบาก พูดลำบาก หรือกลืนลำบาก มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ มีภาวะซึมเศร้า มีอาการใจสั่น หัวใจเต้นผิดปกติ มีการขยายใหญ่ของเต้านมในเพศชายหรือเพศหญิง มีน้ำนมไหลในเพศหญิงที่ไม่ได้ให้นมบุตร ผื่นคัน

เอกสารอ้างอิง

๑.http://www.yaandyou.net/index_result.php#top

๒.คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาระบบ ประสาทส่วนกลาง เล่ม ๑ คณะอนุกรรมการพัฒนายาบัญชียาหลักแห่งชาติ. หน้า ๑๐๑-๑๐๓. พ.ศ.๒๕๕๓.